

Libellen in Zeeland

Periode 2006-2013



HOUTPANTSERJUFFER

Lestes viridis


2006-2010

De Houtpantserjuffer is nog steeds een algemene soort in Zeeland, hoewel er een opmerkelijk verschil zit in het aantal hokken waarin deze soort is waargenomen. Op de onderstaande kaartjes valt vooral de afname van het aantal stippen in Zeeuws-Vlaanderen op, maar ook in de rest van de provincie zijn er in 2006-2010 minder stippen. Alleen op Walcheren is het aantal stippen in beide perioden ongeveer gelijk. De percentuele afname in de provincie komt voor een belangrijk deel door een afname in Zeeuws-Vlaanderen. Het is de vraag of er sprake is van een reële afname, of dat de “verdwenen” stippen slechts aangeven dat de soort in minder hokken is genoteerd. Berekeningen geven aan dat de Houtpantserjuffer een afname toont van ruim 13%, daarmee zou het één van de sterkst afgenomen soorten zijn.




2011-2013

Geen bijzonderheden.



Periode t/m 2005
VW 24 mei 2002
LW 15 november 1999



Periode 2006-2010
27 mei 2010
4 november 2010



TANGPANTSERJUFFER


Lestes dryas

2006-2010


Een sterk toegenomen soort voor Zeeland: in de periode 2006-2010 was er een stijging van 3,2%, van 2 naar 5 uurhokken. In de periode voor 1999 is zij niet geregistreerd, daarna is er één waarneming bij Groede op 16 juli 2001. De nieuwe plekken waar deze soort in 2008 en 2010 is waargenomen, zijn de Schotsman, de Braakman en de kop van Schouwen.

2011-2013

Deze soort heeft zich niet verder uitgebreid, er waren 4 waarnemingen in Zeeuws-Vlaanderen en 1 bij Burgh-Haamstede.



Periode t/m 2005
VW juli 2001
LW id



Periode 2006-2010
3 juni 2010
20 september 2008

TENGERE PANTSERJUFFER


Lestes virens

2006-2010


Met 6 uurhokken is deze soort flink gestegen in onze berekeningen (2,4%). De biotopen van Clinge, Braakman, Schotsman

en Meeuwenduinen op Schouwen vertonen wel enige overeenkomst (voedselarm, rijk begroeide oevers met zegge en russen). Maar al met al gaat het hier om een zeldzame soort, ook in de rest van Nederland, en gaat het

waarschijnlijk om zich tijdelijk vestigende zwervers.



Periode t/m 2005
VW 10 augustus 2005
LW 12 september 2004



Periode 2006-2010
14 juni 2009
8 september 2008



2011-2013

In 2013 werd een populatie ontdekt in Oranjezon, verder 7 waarnemingen in Zeeuws-Vlaanderen en 1 bij Dishoek.




ZWERVENDE PANTSERJUFFER


Lestes barbarus

2006-2010

Deze soort staat erom bekend na invasies langdurig talrijk voor te komen, en dat was in de atlasperiode ook het geval. Maar in de periode 2006-2010 is de Zwervende pantserjuffer duidelijk in aantal en verspreiding achteruit gegaan, wat ook bij enkele andere invasiesoorten het geval is.



Periode t/m 2005
VW 18 mei 2000
LW 8 oktober 2004



Periode 2006-2010
2 juni 2008 2009
11 oktober 2010

2011-2013

Deze soort lijkt in de meeste regio's verder achteruit te zijn gegaan, behalve in Zeeuws-Vlaanderen, waar de soort in meer kilometerhokken is waargenomen.

BRUINE WINTERJUFFER

Sympecma fusca


2006-2010

De Bruine winterjuffer is inmiddels al enige jaren een vaste verschijning op enkele plekken in Zeeland, m.n. in de duinen van Walcheren, in de plasjes langs de A58 bij Rilland en op verspreide plekken langs de Belgische grens. In de periode voor 1999 waren er slechts meldingen uit 3 uurhokken, daarna tot 2005 steeg dat naar 13,7 uurhok. Ongetwijfeld ook door het intensieve zoeken door de hele provincie toen.

Inmiddels zijn in de periode 2006-2010 3 uurhokken minder geregistreerd, maar dat laat het stabiele beeld wel intact, omdat er minder intensief is gezocht. Opvallend is dat er geen melding voor deze soort is gekomen van de Eendenkooi in St. Philipsland, waar de soort zich leek te vestigen.


Dit is de enige soort die als volwassen dier overwintert. In een telpoging in de winter van 2008-2009 werd intensief gezocht, maar niets gevonden. Wel werden 5 exemplaren rondvliegend gezien op 15 maart 2009 bij de Kaalkopplas, Oranjezon. Ook in het seizoen 2009-2010 werden op deze plek tussen de braamstruiken exemplaren gezien. Dit bevestigt wel dat de soort zich er heeft

gevestigd, maar dat was al bekend vanwege de vondst van huidjes van uitgeslopen dieren.



Periode t/m 2005
VW voorjaar 31 maart 2005

najaar 9 juli 2004
LW voorjaar 28 mei 2004



Periode 2006-2010
voorjaar 4 maart 2010

najaar 11 juli 2010
voorjaar 3 juni 2008 en 2010

2011-2013

De Bruine winterjuffer lijkt achteruit te zijn gegaan, er zijn geen waarnemingen meer gemeld uit West-Zeeuws-Vlaanderen, de Braakman en Zuid-Beveland.



